

告示

2020年4月20日改訂

日高歯科クリニック院長 日高豊彦

新型コロナウイルス(COVID-19)感染への対応指針

- ・ 様々な学会、機関から対応指針がでており、それぞれ微妙な差異がありますが、原則的に神奈川県歯科医師会の指針に従います。

出勤時体温測定し出勤時体温表に記載してください

- ・ 検温して熱がないことを確認して登院してください
- ・ 熱がある方は4日間自宅待機後、保健所に電話し指示に従ってください。
- ・ 管理者 長谷川
： その時間に担当患者がいない人が臨機応変に対応してください。

全患者の体温測定と問診票

- ・ 全ての患者に来院時体温測定し、カルテに記載してください。
- ・ 当面、従来の問診票に加え COVID-19 用問診票を使用します。
- ・ 体温が高い患者、問診票上 COVID-19 の感染が疑われる患者は発熱外来での治療を優先します。
「帰国者・接触者相談センター」に相談するよう勧めてください
- ・ 管理者 長谷川
： その時間に担当患者がいない人が臨機応変に対応してください。

予約

- ・ 4, 5月の初診、予約の受付時間は当面
10:00～13:00
14:30～17:00
とします。
- ・ それ以外の時間にしか来院出来ない患者の次回予約は、緊急性がない場合、1ヶ月以降に予約して下さい。患者に協力を依頼して下さい。

診療前にうがいをしてもらって下さい

- ・ リステリン（アルコール）は刺激が強いので薄めて下さい。
- ・ アルコールアレルギーの患者はイソジンうがい薬。
- ・ アルコールアレルギー、ヨードアレルギーは水。

消毒剤

- ・ 0.1%次亜塩素酸ナトリウム
： 水1リットルにキッチンハイター50ml(キャップ約2杯)
COVID-19 はエンベロープ(被膜)を持つウイルスでアルコールや次亜塩素酸水はエンベロープを破壊出来ず完全とは言えません。破壊出来る消毒剤として認可されているものは次亜塩素酸ナトリウムだけです。
次亜塩素酸ナトリウムは人体にも有害で、金属腐食作用もあります。

診療台等の消毒

- ・ 従来通り患者が診療台から退席したら、アルコールで清掃してください。
- ・ 感染が疑わしい患者の場合は 0.1%次亜塩素酸ナトリウムで清掃後、水拭き、乾燥拭きを行ってください。
- ・ 従来通りタービン等器材は患者ごとに滅菌処理をしてください。

その他の消毒

- ・ キーボードカバー、iPad、レントゲンのスイッチ等1時間ごとに0.1%次亜塩素酸ナトリウムで清掃後、水拭き、乾燥拭きを行ってください。
- ・ 管理者衛生士主任 今
： その時間に担当患者がいない人が臨機応変に対応してください。

待合の消毒

- ・ 1時間ごとに患者のふれるところ、トイレドアノブ、便座、ケア入りロドアノブ、オペ1,2 ドアノブを0.1%次亜塩素酸ナトリウムで清掃後、水拭き、乾燥拭きを行ってください。
- ・ 管理者衛生士主任 今
： その時間に担当患者がいない人が臨機応変に対応してください。

排煙窓、医局窓、消毒コーナー窓

- ・ 午前午後 1 回以上あけてください。
- ・ 医局窓、消毒コーナー窓は物が外に落下しないよう注意してください。
- ・ 診療終了時、全て閉じてあることを確認してください。
- ・ 管理者技工士主任 涌井

マスク

- ・ マスクは特別なことがなければ 1 日以上使用してください。
- ・ 使用したマスクは個人の滅菌パックに保存してください。
表と表、裏と裏が接するように入れる
- ・ 滅菌パックに保存したマスクはオートクレーブにかけ、将来供給が無くなった場合の再使用に準備します。
- ・ COVID-19 の感染が疑われる患者は発熱外来での治療が優先されるますが、緊急治療がどうしても必要な場合は N-95 マスク（院長室にあります）を使用して下さい。
- ・ N-95 マスクの入荷予定はありません。N-95 マスクの上にサージカルマスクを付けて使用し、サージカルマスクを交換、N-95 マスクは 3 週間使用してください。

グローブ

- ・ 供給が途絶える可能性があります、よくグローブを洗って（手洗い）長時間使用してください。

エアロゾルを発生させる処置を行う場合には手術衣、帽子、フェースガードを着用してください

- ・ タービン、エンジン、超音波スケーラ、エアースケーラ、PMTc 器具。
- ・ 特別なことがなければ 1 日使用して下さい。

防護装備の仕方は別冊子を見てください